




Progresso in Agricoltura

[www.greenhasiberia.com](http://www.greenhasiberia.com)  
[info@greenhasiberia.com](mailto:info@greenhasiberia.com)

Telf. 950 58 09 42



# NUTRICIÓN ESPECIALIZADA

PARA FRESA,  
FRAMBUESA,  
MORA  
Y ARÁNDANO



Progresso in Agricoltura

[www.greenhasiberia.com](http://www.greenhasiberia.com)

PRODUCTO	FUNCIÓN	RECOMENDACIÓN		APLICACIÓN
		FOLIAR	RIEGO	
<b>MAXIMA</b>	Bioestimulante, con extractos de <i>Ecklonia maxima</i> . Incrementa el desarrollo radicular. Potencia las yemas laterales. Aumenta el calibre.	200 a 300 cc / HI	4 a 5 L /Ha	<b>EN TRANSPLANTE.</b> Después de la primera cosecha, recupera a la planta.
<b>MAGIC P STAR</b>	Fertilizante líquido de fósforo y magnesio. Favorece el enraizamiento en condiciones de escasa iluminación y baja temperatura.	300 cc / HI	5 L /Ha	<b>EN TRANSPLANTE,</b> con el primer riego. También se puede bañar la planta junto al desinfectante. Desde finales de Enero hasta finales de Febrero .
<b>Mr 10 Alta Densità</b>	Aumenta la floración. Mejora el cuajado y la maduración. Freno vegetativo.	200 a 300 cc / HI	4 a 5 L /Ha	<b>EN PERIODO DE FLORACIÓN:</b> Aplicación por riego cada 20 - 25 días. Desde Diciembre hasta Abril, según variedad.
<b>GREENSET</b>	Estimula la floración y el cuaje. <i>Ecklonia maxima</i> , con Boro, Zinc y Molibdeno. Atrae a la abejas polinizadoras.	300 cc / HI	5 L /Ha	<b>EN FLORACIÓN</b> de Diciembre a Abril. Aplicación: foliar cada 15 días. Por riego cada 15 - 20 días.
<b>CALBORON</b>	Calcio complejo por ácidos carboxílicos, de alta calidad y concentración (30%). Absorción y translocación rápida. Aumenta la dureza y peso de los frutos.	200-300 gr/HI	500 g/10 millares de fresa 5 Kg/Ha	Desde <b>INICIO DEL CRECIMIENTO</b> de las primeras hojas (principios de Octubre - Noviembre). En <b>CADA FLORACIÓN</b> de Diciembre a Abril. Aplicación foliar cada 15-20 días.
<b>CALCIOGREEN PS PLUS</b>	Calcio mineral en polvo soluble en agua, 40% de calcio de gran calidad. Solubilidad muy alta y fácil.		5Kg /Ha	Durante <b>TODO EL CICLO</b> por riego, cada semana a 5 Kg/ Ha.
<b>EXPANDO</b>	Incrementa el tamaño del fruto. Calibres uniformes. Se obtiene mayor porcentaje de fruta de primera. Cosechas de mayor valor en el mercado.	250 a 300 cc / HI	No	Desde <b>ENTRADA EN PRODUCCIÓN</b> cada 20 - 25 días mezclado con Calfomyth; 5 ó 6 veces en todo el ciclo.
<b>SILVEST</b>	Aumenta la consistencia del fruto. Mejor postcosecha (Shelf-Life). Mejora la vida útil del producto, mejor conservación.	250 a 300 cc / HI	No	Desde que el fruto está <b>CUAJADO</b> hasta FIN de <b>RECOLECCIÓN.</b> Una semana después de aplicar Calboron. Repetir cada 15 o 20 días.

